

Антиапитокс

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Лекарственная форма: порошок для приема внутрь.

Антиапитокс в качестве действующих веществ в 1 г препарата содержит: этилметилгидроксипиридина сукцинат - 20 мг, Янтарную кислоту - 100 мг и вспомогательные вещества.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой порошок от белого до светло-серого цвета. допускается наличие желтоватого или кремового оттенка.

Фармакологическое действие

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата для ветеринарного применения: детоксицирующие средства в комбинациях.

Лекарственный препарат способствует очищению организма пчел от токсинов, стимулирует функцию иммунной системы и адаптивные возможности.

Этилметилгидроксипиридина сукцинат повышает резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов, применяется при лечении острых отравлений. Снижает количество токсинов в организме.

Действуя на организм в качестве антиоксиданта, подавляет цепочку окислительных реакций и устраняет свободные радикалы. Механизм действия обусловлен его антигипоксантным, антиоксидантным и мембранопротекторным действием. Ингибирует процессы перекисного окисления липидов, повышает активность супероксиддисмутазы, повышает соотношение "липид-белок", уменьшает вязкость мембраны, увеличивает ее текучесть.

Янтарная кислота укрепляет иммунитет, восстанавливает энергетический потенциал клеток при интоксикациях, способствует выведению из организма токсических веществ, стимулирует адаптивные возможности к изменяющимся условиям окружающей среды.

Антиапитокс по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим и сенсibiliзирующим действием.

Антиапитокс малотоксичен для пчел, не оказывает отрицательного влияния на общее состояние, развитие и продуктивность пчелиных семей.

Дозы и способ применения

Лекарственный препарат Антиапитокс применяют с лечебно-профилактической целью для защиты пчел от отравлений токсическими веществами различной этиологии, стимуляции функции иммунной системы и адаптивных возможностей к изменяющимся условиям

окружающей среды, что приводит к повышению резистентности, продуктивности, увеличению срока хозяйственного использования и высокому проценту выхода из зимовки пчелиных семей.

Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 суток до начала главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата в товарный мед.

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

При применении лекарственного препарата возрастные ограничения отсутствуют.

Лекарственный препарат Антиапитокс применяют весной и осенью за неделю до проведения противоварроатозных обработок пчелиных семей и осенью за неделю до проведения противоварроатозных обработок пчелиных семей и при первых признаках токсикозов (отравлений) - нектарного, пыльцевого, падевого. В летний период лекарственный препарат рекомендуется применять за неделю до предполагаемых обработок сельхозкультур пестицидами, а также при первых признаках химического или солевого токсикоза.

Лекарственный препарат применяют с сахарным сиропом из расчета 2г препарата на одну пчелиную семью силой 10-12 улочек.

Для приготовления сиропа с лекарственным препаратом 20 г препарата растворяют в 100 мл теплой воды, а затем смешивают с 10 литрами сахарного сиропа, приготовленного в соотношении 1:1 (или 40 г препарата растворяют в 100 мл теплой воды, а затем смешивают с 20 л сахарного сиропа, приготовленного в соотношении 1:1; или 60 г препарата растворяют в 100 мл теплой воды, а затем смешивают с 30 л сахарного сиропа, приготовленного в соотношении 1:1), сироп с лекарственным препаратом помещают в чистые кормушки и скармливают пчелам из расчета 100 мл на 1 рамку с пчелами.

Антиапитокс применяют пчелам с профилактической целью 3 раза с интервалом 2-3 дня, с лечебной целью - 4-5 раз с интервалом 3 дня.

В подвергшихся отравлению пчелиных семьях сокращают и утепляют гнезда, убирают рамки со свежим нектаром и пергой. В гнездах перераспределяют расплод, оставляя столько, чтобы пчелы могли обсиживать его полностью.

Освободившиеся ульи подвергают механической очистке, промывают 5%-ным раствором щелочи, затем чистой теплой водой.

Соты с медом и пергой от погибших семей перетапливают на воск, который подлежит использованию только в технических целях.

Падевый и кристаллизующийся мед в гнезда пчел полностью заменяют на доброкачественный.

Особые указания

Особенностей действия при первом применении лекарственного препарата и его отмене не установлено.

Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной обработки применение препарата следует возобновить в той же дозе по той же схеме.

Мед разрешается использовать в пищевых целях не ранее, чем через 14 суток после окончания применения лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией.

Лекарственный препарат Антиапитокс выпускается без рецепта ветеринарного врача.

Упаковка

Лекарственный препарат Антиапитокс выпускают расфасованным по 20 и по 40г, в герметично запаянных пакетах соответствующей вместимости из металлизированной пленки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя в защищённом от влаги и прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0° С до 25° С.

Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат Антиапитокс отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства.