

Антивир

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Торговое наименование лекарственного препарата: Антивир.

Международное непатентованное наименование: умифеновир.

Лекарственная форма:

порошок для приема внутрь

Антивир в качестве действующего вещества в 1 г содержит: умифеновира гидрохлорид - 90 мг и вспомогательные вещества.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой порошок белого цвета. Допускается наличие зеленовато-желтоватого или кремового оттенка.

Фармакологическое действие

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата для ветеринарного применения: противопротозойные средства .

Умифеновир, входящий в состав лекарственного препарата, угнетает выход из клеток вирусных частиц, способствует их гибели, оказывая противовирусное действие.

Антивир по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием.

Антивир не токсичен для пчел, не оказывает отрицательного влияния на общее состояние, развитие и продуктивность пчелиных семей, не ухудшает качество товарной продукции пчеловодства.

Дозы и способ применения

Лекарственный препарат Антивир применяют с лечебно-профилактической целью при вирусных болезнях пчел в весенний период до основного медосбора и в конце лета, после откачки меда.

Запрещается применение лекарственного препарата менее чем за 14 дней до начала главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата в товарный мед.

Одновременно с лечением семей по возможности заменяют маток на здоровых плодных, проводят дезинфекции на пасеках.

В весенне-летний период лекарственный препарат скармливают пчелам с канди или сахарным сиропом из расчета 2 г препарата на одну пчелиную семью силой 8-10 улочек.

Для приготовления канди с лекарственным препаратом в медово-сахарное тесто (Канди) вносят препарат из расчета:

- 5 г на 1,25 кг канди;
- 10 г на 2,5 кг канди

и скармливают пчелам по 0.5 кг на семью пчел.

Для приготовления сиропа с лекарственным препаратом в сироп вносят препарат из расчета:

- 5 г препарата вносят в 50 мл теплой воды, а затем смешивают с 2,5 литрами сахарного сиропа, приготовленного в соотношении 1:1;
 - 10 г препарата вносят в 50 мл теплой воды, а затем смешивают с 5 литрами сахарного сиропа, приготовленного в соотношении 1:1
- и скармливают пчелам из расчета 100 мл на 1 рамку с пчелами.

Лекарственный препарат применяют 5-7 раз с интервалом 5-6 дней, до исчезновения клинических признаков заболевания.

Одновременно с лечением проводят дезинфекцию ульев, сот и рабочего инвентаря согласно инструкции по дезинфекции на пасаках. Подмор и ульевый мусор сжигают.

Особые указания

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению и этикетку).

Упаковка

Антивир выпускают расфасованным по 5 г и 10 г в герметично запаянных пакетах из металлизированной пленки соответствующей вместимости. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0 °С до 25 °С.

Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства.