

Апидез

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Лекарственная форма: пластина ветеринарная.

Апидез® в качестве действующих веществ в 1 пластине содержит: тимол – 60 мг, эфирное масло пихты – 80 мг и вспомогательные вещества .

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой деревянные пластины от светло-желтого до коричневого цвета с запахом эфирного масла.

Фармакологическое действие

Апидез® относится к фармакотерапевтической группе акарицидных лекарственных средств.

Действующие вещества тимол и эфирное масло пихты оказывают выраженное акарицидное и репеллентное действие против взрослых форм *Varroa destructor*. Эфирное масло являясь натуральным веществом, обладают помимо специфического акарицидного эффекта также бактерицидными, фунгицидными и инсектицидными свойствами, помогая пчелиным семьям самостоятельно справляться с другими различными болезнями.

Применение Апидеза® не вызывает возникновения резистентных популяций клещей.

Апидез® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при применении в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-резорбтивного, местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

Апидез® не токсичен для пчел, в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность и продуктивность семей.

Дозы и способ применения

Лекарственный препарат Апидез® применяют для лечения и профилактики варроатоза медоносных пчел в весенний и осенний периоды при наличии минимального количества расплода.

Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 дней до начала главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата в товарный мед.

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку). Лекарственный препарат запрещается применять пчелам в период главного медосбора, возрастные ограничения отсутствуют.

Апидез® применяют в весенний и осенний периоды. Лекарственный препарат размещают в ульях из расчёта 2 пластины на 10 – 12 гнездовых рамок. Для маленьких семей (до 6 рамок), отводков и нуклеусов достаточно 1 пластины, которую размещают в центре гнезда. В слабой семье подвешивают одну пластину между 3 и 4 соторамками, в сильной одну пластину между 3 и 4 соторамками, вторую пластину между 7 и 8 соторамками. Пластины оставляют в семьях на срок от 3 до 30 суток, в зависимости от количества печатного расплода, после чего их удаляют.

Особые указания

Побочных реакций и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

Симптомы передозировки лекарственным препаратом у пчел не установлены.

Апидез® не следует применять совместно с другими акарицидными лекарственными препаратами.

Особенностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не установлено.

Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

Мед разрешается использовать в пищевых целях не ранее, чем через 14 суток после окончания применения лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией.

Упаковка

Лекарственный препарат Апидез® выпускают расфасованным по 10 пластин в герметично запаянных пакетах из металлизированной пленки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат Апидез® отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

После вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению не подлежит.