

Апигель

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Торговое наименование лекарственного препарата: Апигель

Международное непатентованное наименование: тимол.

Лекарственная форма: гель для наружного применения.

Апигель в качестве действующего вещества содержит: тимол - 0,5% и вспомогательные вещества.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой гелеобразную массу от белого до светло-серого цвета.

Фармакологическое действие

Апигель относится к фармакотерапевтической группе акарицидных лекарственных средств. Действующее вещество тимол оказывает выраженное акарицидное и репеллентное действие против взрослых форм *Varroa destructor* и *Acarapis Woodi*. Применение Апигеля не вызывает возникновения резистентных популяций клещей. Апигель по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при применении в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-резорбтивного, местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия. Апигель не токсичен для пчел, в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность и продуктивность пчелиных семей.

Дозы и способ применения

Лекарственный препарат Апигель применяют с лечебно-профилактической целью при варроатозе и акарапидозе медоносных пчел в весенний и осенний периоды при наличии минимального количества расплода.

Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 дней до начала главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата в товарный мед.

Апигель применяют в весенний и осенний периоды. На верхней поверхности герметичного пакета в шахматном порядке проделывают 8 - 10 отверстий (диаметром 3 мм) до появления капель геля и размещают на дне улья из расчета 50 г (1 пакет) на 10 - 12 гнездовых рамок.

Для мелких семей (до 6 рамок), отводков и нуклеусов достаточно 25 г геля.

Обработку проводят 2кратно по мере удаления пчелами геля (во время чистки улья) через 5 - 7 дней.

Особые указания

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения. Пустую упаковку из под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку). Лекарственный препарат запрещается применять пчелам в период главного медосбора, возрастные ограничения отсутствуют. Побочных реакций и осложнений при использовании лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, как правило, не наблюдается. Симптомы передозировки лекарственным препаратом у пчел не установлены. Апигель не следует применять совместно с другими акарицидными лекарственными препаратами. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не установлено. Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

Упаковка

Лекарственный препарат Апигель выпускают расфасованным по 50 г в герметично запаянных пакетах из металлизированной пленки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат Апигель отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности. После вскрытия упаковки лекарственного препарата хранению не подлежит.