

Асконазол 0.5 мл

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Лекарственная форма: раствор для наружного применения и приема внутрь.

Асконазол® в качестве действующего вещества содержит: клотримазол – 3,2% и вспомогательные вещества.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой однородную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Фармакологическое действие

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата для ветеринарного применения: противогрибковые средства.

Клотримазол, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром противогрибкового действия, активен в отношении возбудителей аскофероза и аспергиллеза пчел.

Асконазол® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим и сенсibiliзирующим действием.

Асконазол® малотоксичен для пчел, не оказывает отрицательного влияния на общее состояние, развитие и продуктивность пчелиных семей.

Дозы и способ применения

Лекарственный препарат Асконазол® применяют для лечения и профилактики аскофероза и аспергиллѐза пчел в весенний период до основного медосбора или летом, после откачки товарного меда.

Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 дней до начала главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата в товарный мед.

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании

компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Лекарственный препарат запрещается применять пчелам в период главного медосбора, возрастные ограничения отсутствуют.

Асконазол® применяют в весенний период до основного медосбора или летом, после откачки товарного меда.

В весенний период или летом, при неблагоприятных для пчеловодства погодных условиях, Асконазол® назначают с кормом. С этой целью перед применением готовят «маточный раствор» путем разведения 1 мл препарата в 50 мл кипяченой теплой воды, который затем вносят в 3 л теплого (35-40° С) сахарного сиропа (или путем разведения 0,5 мл препарата в 50 мл кипяченой теплой воды, который затем вносят в 1,5 л теплого (35-40° С) сахарного сиропа), приготовленного в соотношении 1:1 и тщательно перемешивают.

Сахарный сироп с лекарственным препаратом скармливают пчелам из расчета 300-400 мл на семью 2-3-хкратно с интервалом 3-5 дней.

В летний период Асконазол® применяют путем опрыскивания пчел на соторамках. С этой целью перед применением готовят «маточный раствор», путем разведения 1 мл препарата в 50 мл кипяченой теплой воды, который затем вносят 1 л теплого сахарного сиропа (или путем разведения 0,5 мл препарата в 50 мл кипяченой теплой воды, который затем вносят в 0,5 л сахарного сиропа), приготовленного в соотношении 1:4, тщательно перемешивают и с помощью мелкодисперсного опрыскивателя обрабатывают соторамки с пчелами с обеих сторон из расчета 10-12 мл на соторамку.

Пчелиные семьи обрабатывают 2-3хкратно с интервалом 3 – 5 дней в первой половине дня, при температуре окружающего воздуха не ниже +10°С.

Особые указания

Побочных реакций и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

Симптомы передозировки лекарственным препаратом у пчел не установлены.

Асконазол® не следует применять совместно с другими фунгицидными лекарственными препаратами.

Особенностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не установлено.

Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

Мед разрешается использовать в пищевых целях не ранее, чем через 14 суток после окончания применения лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией.

Упаковка

Лекарственный препарат Асконазол® выпускают расфасованным по 0,5 мл и 1,0 мл в стеклянные ампулы соответствующей вместимости, упакованные в полимерные блистеры. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат Асконазол® отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

После вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению не подлежит.