

Бипин-Т 1 мл

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Лекарственная форма: раствор для приготовления эмульсии для наружного применения.

Бипин-Т[®], в качестве действующего вещества содержит амитраз - 12,5% и вспомогательные вещества.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой однородную жидкость от светло-желтого до коричневого цвета.

Фармакологическое действие

Бипин-Т[®] относится к фармакотерапевтической группе акарицидных лекарственных средств.

Входящий в состав лекарственного препарата амитраз обладает ярко выраженным акарицидным контактным действием против взрослых форм *Varroa destructor*. Механизм действия амитраза заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель клещей.

Применение лекарственного препарата Бипин-Т[®] не вызывает возникновения резистентных популяций клещей.

Бипин-Т[®] по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при применении в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-резорбтивного, местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

Бипин-Т[®] не токсичен для пчел, в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность и продуктивность семей.

Дозы и способ применения

Лекарственный препарат Бипин-Т[®] применяют для лечения и профилактики варроатоза медоносных пчел.

Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 суток до начала главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата в товарный мед.

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку). Лекарственный препарат запрещается применять пчелам в период главного медосбора, возрастные ограничения отсутствуют.

Бипин-Т® применяют в весенний и осенний периоды при минимальном количестве расплода, в первой половине дня и температуре окружающего воздуха не ниже 10°C.

Перед применением 1 мл лекарственного препарата разводят в 2 литрах (0,5 мл в 1 литре) теплой (35-40°C) воды и тщательно перемешивают до образования однородной эмульсии, которая используется в течение одного дня.

Приготовленную эмульсию набирают в шприц и равномерно поливают между рамками в дозе 10 мл на одну улочку.

Лекарственный препарат следует применять двукратно с интервалом 7 суток в первой половине дня, в летнюю погоду при температуре окружающего воздуха не ниже 10°C.

Особые указания

Побочных реакций и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

Симптомы передозировки лекарственным препаратом у пчел не установлены.

Бипин-Т® не следует применять совместно с другими акарицидными лекарственными препаратами.

Особенностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не установлено.

Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

Использование меда в пищевых целях разрешается не ранее, чем через 14 суток после окончания применения препарата.

Упаковка

Лекарственный препарат Бипин-Т® выпускают расфасованным по 0,5 мл и 1,0 мл в стеклянные ампулы, упакованные в полимерные блистеры. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.
Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат Бипин-Т® отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

После вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению не подлежит.