

Бисанар 1 мл

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Бисанар® в 1 мл в качестве действующего вещества содержит: тимол - 100 мг и вспомогательные вещества.

По внешнему виду препарат представляет собой однородную жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета.

Фармакологическое действие

Бисанар® относится к группе акарицидных лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Бисанар® оказывает выраженное акарицидное действие против возбудителей варроатоза медоносных пчел, а также обладает бактерицидным, фунгицидным и дезинфицирующим свойствами.

Применение Бисанара® не вызывает возникновения резистентных популяций клещей.

Бисанар® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при применении в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-резорбтивного, местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

Бисанар® не токсичен для пчел, в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность и продуктивность семей.

Дозы и способ применения

Порядок применения:

Лекарственный препарат Бисанар® применяют для лечения и профилактики варроатоза медоносных пчел.

Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 дней до начала главного медосбора во избежание попадания компонентов препарата в товарный мед.

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Лекарственный препарат запрещается применять пчелам в период главного медосбора, возрастные ограничения отсутствуют.

Бисанар® применяют в весенний и осенний периоды, при минимальном количестве расплода.

Перед применением 1мл препарата разводят в 1 литре теплой (35-40°C) воды (или 2 мл препарата разводят в 2 литрах теплой (35-40°C) воды) до получения равномерной эмульсии, которая используется в течение одного рабочего дня.

Приготовленную эмульсию набирают в шприц и поливают тонкой струйкой между рамками из расчета 10 мл на одну улочку.

Лечебные обработки следует проводить двукратно с интервалом 7 дней в первой половине дня, в летнюю погоду при температуре окружающего воздуха не ниже +10°C.

Особые указания

Побочных реакций и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

Симптомы передозировки препаратом у пчел не установлены.

Бисанар® не следует применять совместно с другими акарицидными лекарственными препаратами.

Особенностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не установлено.

Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

Мед, полученный после применения лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, используют в пищевых целях без ограничений.

Упаковка

Лекарственный препарат Бисанар® выпускают расфасованным по 1,0 мл и 2,0 мл в стеклянные ампулы, упакованные в полимерные блистеры.

Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

Неиспользованный лекарственный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат Бисанар® отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.