

Микоаск полоски

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Торговое наименование лекарственного препарата: Микоаск®. Международное непатентованное наименование: клотримазол.

Лекарственная форма: пластина ветеринарная

Микоаск® в 1 пластине в качестве действующего вещества содержит клотримазол – 30 мг и вспомогательные вещества.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой картонные пластины от белого до серого цвета.

Фармакологическое действие

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата для ветеринарного применения: противогрибковые средства.

Клотримазол, входящий в состав препарата, обладает широким спектром противогрибкового действия, активен в отношении возбудителей аскофероза и аспергиллеза пчел.

Микоаск® по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим и sensibilizing действием.

Микоаск® малотоксичен для пчел, не оказывает отрицательного влияния на общее состояние, развитие и продуктивность пчелиных семей.

Дозы и способ применения

Лекарственный препарат Микоаск® применяют с лечебно-профилактической целью при аскоферозе и аспергиллёзе пчел в весенний период до основного медосбора или летом, после откачки товарного меда.

Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 дней до начала главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата в товарный мед.

Перед применением лекарственного препарата на неблагополучной пасеке осматривают все семьи пчел, рамки с сильно пораженным расплодом удаляют, больные семьи пересаживают на чистую вошину и в дезинфицированные ульи. Гнезда больных семей сокращают и утепляют, при необходимости проводят смену маток.

Микоаск® размещают в ульях, помещая их на специальном крепежном устройстве (можно использовать проволоку для наращивания рамок) в улочку между рамкой с

расплодом и следующей (кроющей) рамкой из расчета – 1 пластина на 6 гнездовых рамок, занятых пчелами.

Обработку проводят 2–3 раза по мере удаления пчелами пластин из гнезда (через 6–7 дней). Обработку семей пчел прекращают не позднее, чем за две недели до начала основного медосбора во избежание попадания препарата в товарный мёд.

Мед разрешается использовать в пищевых целях не ранее, чем через 14 суток после окончания применения лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией.

Особые указания

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Лекарственный препарат запрещается применять пчелам в период главного медосбора, возрастные ограничения отсутствуют.

Микоаск® применяют в весенний период до основного медосбора или летом, после откачки товарного меда.

Побочных реакций и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

Симптомы передозировки лекарственным препаратом у пчел не установлены.

Микоаск® не следует применять совместно с другими фунгицидными лекарственными препаратами.

Особенностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не установлено.

Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

Упаковка

Лекарственный препарат Микоаск® выпускают расфасованным по 10 пластин в герметично запаянных пакетах из металлизированной пленки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0 °С до 25 °С.

Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат Микоаск® отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.