

Микозол

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Лекарственная форма: пластина ветеринарная.

Микозол® в качестве действующего вещества в 1 пластине содержит: тербинафина гидрохлорид – 7 мг и вспомогательные вещества.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой картонные пластины от белого до серого цвета.

Фармакологическое действие

Микозол® относится к группе фунгицидных лекарственных средств.

Тербинафина гидрохлорид, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром противогрибкового действия, активен в отношении возбудителей аскофероза и аспергиллеза пчел.

Микозол® по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием.

Микозол® малотоксичен для пчел, не оказывает отрицательного влияния на общее состояние, развитие и продуктивность пчелиных семей.

Дозы и способ применения

Лекарственный препарат Микозол® применяют для лечения и профилактики аскофероза и аспергиллёза пчел в весенний период до основного медосбора или летом, после откачки товарного меда.

Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 суток до начала главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата в товарный мед.

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Лекарственный препарат запрещается применять пчелам в период главного медосбора, возрастные ограничения отсутствуют.

Микозол® применяют в весенний период до основного медосбора или летом, после откачки товарного меда.

Перед применением лекарственного препарата на неблагополучной пасеке осматривают все семьи пчел, рамки с сильно пораженным расплодом удаляют, больные семьи пересаживают на чистую вошину и в продезинфицированные ульи. Гнезда больных семей сокращают и утепляют, при необходимости проводят смену маток.

Пластины Микозола® размещают в ульях, помещая их на специальном крепежном устройстве (можно использовать проволоку для наращивания рамок) в улочку между рамкой с расплодом и следующей (кроющей) рамкой из расчета – 1 пластина на 6 гнездовых рамок, занятых пчелами.

Обработку проводят 2 – 3 раза по мере удаления пчелами пластин из гнезда (с интервалом через 6 – 7 суток). Обработку семей пчел прекращают не позднее, чем за 14 суток до начала основного медосбора во избежание попадания препарата в товарный мёд.

Особые указания

Побочных реакций и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

Симптомы передозировки лекарственным препаратом у пчел не установлены.

Микозол® не следует применять совместно с другими фунгицидными лекарственными препаратами.

Особенностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не установлено.

Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

Мед разрешается использовать в пищевых целях не ранее, чем через 14 суток после окончания применения лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией.

Упаковка

Лекарственный препарат Микозол® выпускают расфасованным по 10 пластин в герметично запаянных пакетах из металлизированной пленки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат Микозол® отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя 3 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

После вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению не подлежит.