

Незамин 10 таблеток

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Торговое наименование лекарственного препарата : Незамин

Международное непатентованное название : римантадин, лизин, метионин, триптофан, пиридоксин.

Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

Незамин в 1 таблетке в качестве действующих веществ содержит: римантадина гидрохлорид - 5 мг, L-лизина гидрохлорид - 48 мг, метионин - 24 мг, L-триптофан - 18 мг, пиридоксина гидрохлорид - 1,8 мг и вспомогательные вещества.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой таблетки округлой формы от белого до кремового цвета.
Допускается желтоватый оттенок.

Фармакологическое действие

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата для ветеринарного применения: противовирусные средства в комбинациях.

Входящие в состав препарата незаменимые аминокислоты, пиридоксина гидрохлорид и римантадина гидрохлорид усиливают иммунную систему организма пчел, повышают сопротивляемость пчел к заболеваниям, увеличивают силу, повышают продуктивность, способствуют успешной зимовке пчелиных семей.

Римантадина гидрохлорид - противовирусное средство. Препятствует развитию сезонных вирусных заболеваний и ослаблению иммунитета.

L-лизина гидрохлорид способствует интенсивному всасыванию кальция, наращиванию мышечного белка, образованию коллагена и антител, углеводному обмену и производству организмом гормонов и ферментов.

L-триптофан влияет на регуляцию воспроизводительной функции, способствует нормализации синтеза серотонина, никотиновой кислоты, и других соединений, необходимых для функционирования организма.

Метионин играет важнейшую роль в процессах обмена веществ, роста мышечной массы, способствует быстрому росту молодняка.

Пиридоксина гидрохлорид играет важную роль в обмене белков, входя в состав ферментов, катализирующих превращение аминокислот, способствует увеличению размеров яичников и повышению яйценоскости маток.

Незамин по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает местнораздражающим и сенсibiliзирующим действием.

Дозы и способ применения

Лекарственный препарат Незамин применяют с лечебно-профилактической целью для усиления иммунной системы организма пчел, повышения яйценоскости маток, реабилитации семей пчел в период болезней и при отравлениях, увеличения продолжительности жизни и продуктивности, благополучного выхода из зимовки и при отсутствии в семьях перги.

Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 дней до начала главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата в товарный мед.

Незамин применяют в смеси с сахарным сиропом весной (апрель-май) перед главным медосбором и в конце лета (август-сентябрь) после откачки меда из расчета 2 таблетки на одну пчелосемью силой 10 рамок.

Лечебный сироп готовят непосредственно перед применением. Для этого 2 таблетки Незамина тщательно размельчают и растворяют в 50 мл теплой воды (35°C - 40°C) до полного растворения, а затем смешивают с 1 литром сахарного сиропа, приготовленного в соотношении 1:1, и скармливают пчелам в чистых кормушках из расчета 100 мл на 1 рамку с пчелами 4-5 раз с интервалом 2 - 3 дня.

Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности.

В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применять как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

Мед, полученный после применения лекарственного препарата Незамин в соответствии с настоящей инструкцией, может быть использован на общих основаниях.

Особые указания

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Лекарственный препарат не предназначен для применения теплокровным животным, возрастные ограничения для пчел отсутствуют.

Упаковка

Лекарственный препарат Незамин выпускают расфасованным по 10, 20, 30, 40 таблеток в блистеры или полимерные банки (флаконы), герметично укупоренные навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия, упакованные в картонные пачки.

Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 до 25°C.

Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат Незамин отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года с даты производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.