

Нозевир 10 г

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Торговое наименование лекарственного препарата: Нозевир.

Международное непатентованное наименование: орнидазол, умифеновир.

Лекарственная форма: порошок для приема внутрь

Нозевир в 1 г в качестве действующих веществ содержит: орнидазол - 200 мг, умифеновира гидрохлорид - 90 мг и вспомогательные вещества.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой порошок от белого до белого с зеленовато-желтым или бежевым оттенком цвета.

Фармакологическое действие

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата для ветеринарного применения: противопротозойные средства в комбинациях.

Входящие в состав препарата орнидазол и умифеновир обладают широким спектром противовирусного действия и высокой активностью в отношении возбудителей протозойных инвазий (*Nozema apis* и *Nozema ceranae*) и облигатных анаэробных бактерий.

Нозевир по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим и сенсibiliзирующим действием.

Нозевир малотоксичен для пчел, не оказывает отрицательного влияния на общее состояние, развитие и продуктивность пчелиных семей.

Дозы и способ применения

Лекарственный препарат Нозевир применяют с лечебно-профилактической целью при нозематозе и вирусных болезнях пчел в весенний период до основного медосбора и в конце лета, после откачки меда.

Запрещается применение лекарственного препарата менее чем за 14 дней до начала главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата в товарный мед.

В весенний период Нозевир скармливают пчелам с медово-сахарным тестом (канди) или сахарным сиропом из расчета 0,5 г лекарственного препарата на одну пчелиную семью силой 8-10 улочек.

Для приготовления канди с лекарственным препаратом в медово-сахарное тесто(канди) вносят препарат из расчета 5 г на 5 кг канди (или 10 г на 10 кг канди) и скармливают пчелам по 0,5 кг на семью.

Для приготовления сахарного сиропа с лекарственным препаратом вносят 5 г препарата в 50 мл теплой воды, а затем смешивают с 10 литрами сахарного сиропа, приготовленного в соотношении 1:1 (или вносят 10 г препарата в 50 мл теплой воды, а затем смешивают с 20 л сахарного сиропа, приготовленного в соотношении 1:1) и скармливают пчелам в чистых кормушках из расчета 100 мл на 1 рамку с пчелами.

Лекарственный препарат применяют 3-5 раз с интервалом 4-6 дней, до исчезновения клинических признаков заболевания. Одновременно с лечением семей проводят дезинфекцию ульев, сот и рабочего инвентаря согласно инструкции по дезинфекции на пасеках.

Нозевир не следует применять совместно с другими лекарственными препаратами, предназначенными для лечения протозойных и вирусных болезней пчел.

Мед разрешается использовать в пищевых целях не ранее, чем через 14 суток после окончания применения лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией.

Особые указания

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению и этикетку).

Упаковка

Лекарственный препарат Нозевир выпускают расфасованным по 5 г и 10 г в герметично запаянных пакетах соответствующей вместимости из металлизированной пленки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0 °С до 25°С.

Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат Нозевир отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства.