

Оксибактоцид пластины

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Лекарственная форма: пластина ветеринарная.

Оксибактоцид® пластины в качестве действующих веществ в 1 пластине содержат: окситетрациклина гидрохлорид – 30 мг, гентамицина сульфат - 20 мг, вспомогательные вещества, картон фильтровальный.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой картонные пластины от светло-желтого до темно-коричневого цвета.

Фармакологическое действие

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата для ветеринарного применения: тетрациклины в комбинациях.

Окситетрациклина гидрохлорид и гентамицина сульфат, входящие в состав препарата, обладают широким спектром бактериостатического и бактерицидного действия в отношении возбудителей гнильцовых болезней пчёл.

Препарат Оксибактоцид® пластины по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладают местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием.

Препарат Оксибактоцид® пластины малотоксичен для пчел, не оказывает отрицательного влияния на общее состояние, развитие и продуктивность пчелиных семей.

Дозы и способ применения

Лекарственный препарат Оксибактоцид® пластины применяют для лечения и профилактики гнильцовых болезней пчел в весенний период до основного медосбора или летом, после откачки товарного меда.

Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 дней до начала главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата в товарный мед.

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с

гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Лекарственный препарат запрещается применять пчелам в период главного медосбора, возрастные ограничения отсутствуют.

Перед применением препарата на неблагополучной пасеке осматривают все семьи пчел, рамки с сильно пораженным расплодом удаляют, больные семьи пересаживают на чистую вошину и в продезинфицированные ульи. Гнезда больных семей сокращают и утепляют, при необходимости проводят смену маток.

Оксибактоцид® пластины размещают в ульях, помещая их на специальном крепежном устройстве (можно использовать проволоку для наращивания рамок) в улочку между рамкой с расплодом и следующей (кроющей) рамкой из расчета – 1 пластина на 6 гнездовых рамок, занятых пчелами.

Обработку проводят 2–3хкратно по мере удаления пчелами пластин из гнезда (через 6 – 7 дней). Обработку семей пчел прекращают не позднее, чем за две недели до начала основного медосбора во избежание попадания препарата в товарный мёд.

Особые указания

Побочных реакций и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

Симптомы передозировки лекарственным препаратом у пчел не установлены.

Оксибактоцид® пластины не следует применять совместно с другими лекарственными препаратами бактериостатического и бактерицидного действия.

Особенностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не установлено.

Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

Мед разрешается использовать в пищевых целях не ранее, чем через 14 суток после окончания применения лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией.

Упаковка

Лекарственный препарат Оксибактоцид® пластины выпускают расфасованным по 10 пластин в герметично запаянных пакетах из металлизированной пленки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°С до 25°С.

Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат Оксисбактоцид® пластины отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

После вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению не подлежит.