

# Полисан

## Инструкция по применению

### Состав и форма выпуска

Содержание действующих веществ на 1 пластину: клотримазол – 12 мг, вспомогательные вещества.

### Дозы и способ применения

Обработку производят в отсутствие пчел из расчета 2 пластины на 10-12 рамочный улей. Для этого подлежащие обработке пчелосемьи пересаживают в чистые ульи. В зависимости от состояния пчелосемей их подвергают профилактической обработке против аскофероза и аспергиллеза или не подвергают. Для этого используют соответствующие лекарственные средства строго в соответствии с инструкцией. Из обрабатываемых ульев удаляют подмор, мусор и сжигают. Пустые рамки (с натянутой проволокой) и инвентарь размещают внутри подготовленного улья. Пластины прокалывают проволокой, поджигают, затем пламя гасят и тлеющие пластины закрепляют на верхней проволоке рамок. Далее леток закрывают и улей герметизируют. Экспозиция составляет 1 час. По окончании обработки летки открывают, а истлевшие пластины удаляют. На следующий день из обработанных ульев извлекают инвентарь, возвращают пчелосемьи. Средство не следует применять одновременно с другими противогрибковыми препаратами. Мед от пчелосемей, размещенных в ульях, подвергшихся обработке, используют в пищу на общих основаниях.

### Упаковка

Пластины Полисан выпускают расфасованным по 10 пластин в герметично запаянных пакетах из металлизированной пленки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

### Условия хранения

Хранить в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 до 25 С. Хранить в недоступном для детей месте! Не применять по истечении срока годности.