

Тропигель

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Лекарственная форма: гель для наружного применения.

Тропигель в качестве действующего вещества содержит: муравьиную кислоту - 40% (в пересчете на 100% вещество), и вспомогательные вещества.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой гелеобразную массу от бесцветного до светло-серого цвета с резким запахом муравьиной кислоты.

Фармакологическое действие

Тропигель относится к фармакотерапевтической группе акарицидных лекарственных средств.

Муравьиная кислота обладает острым акарицидным действием, эффективно уничтожает самок и самцов клещей видов *Tropilaelaps* spp. и *Varroa* spp., паразитирующих на расплоде медоносных пчел и взрослых пчелах. Активна в отношении трахейного клеща пчел *Acarapis Woodi*.

Применение Тропигеля не вызывает возникновения резистентных популяций клещей в пчелосемьях.

Тропигель по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), обладает местно-раздражающим действием на кожу, слизистые оболочки и конъюнктиву глаз.

Лекарственный препарат не токсичен для пчел, в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность пчелиных семей, не накапливается в продуктах пчеловодства.

Дозы и способ применения

Обработку пчелиных семей лекарственным препаратом проводят весной: при тропилеллапсозе - после начала яйцекладки пчелиной маткой, при варроатозе и акарапидозе - после массового облета пчел, а также в летне-осенний период после откачки товарного меда при температуре внешнего воздуха от 12°C до 30°C.

В обрабатываемых Тропигелем пчелосемьях должна быть обеспечена хорошая вентиляция.

Вскрывают вторичную упаковку и извлекают пакет.

Пакет из металлизированной пленки.

В пакете из металлизированной пленки проделывают 4 отверстия диаметром около 0,5 см и размещают на дне улья отверстиями вверх.

Пакет из кислотопроницаемого нетканого материала.

Пакет из кислотопроницаемого нетканого материала располагают на верхних брусьях соторамок под холстиком.

Тропигель применяют из расчета: 1 пакет (25 г препарата) на одну семью силой 5-7 улочек, 2 пакета (50 г препарата) на одну семью силой 8-14 улочек (пакеты кладут на расстоянии 15-20 см друг от друга). Пакеты оставляют в ульях на срок 7 дней, затем удаляют и сразу заменяют на новые. Новые пакеты оставляют в ульях на срок 7 дней, после чего удаляют и утилизируют.

При повторном обнаружении клещей в ульях через 10 дней после завершения обработок проводят дополнительную обработку, помещая в улей 1 или 2 пакета Тропигеля (в зависимости от силы семьи) и оставляя до полного испарения препарата.

При обнаружении клещей хотя бы в одной семье, ранее благополучной по клещевой инвазии, проводят профилактическую обработку всех ульев, прежде не обработанных препаратом, помещая 1-2 пакета Тропигеля в улей и оставляя до полного испарения препарата.

По завершении обработок ульев Тропигелем необходимо провести мероприятия, направленные на восстановление здоровья и нормальной жизнедеятельности пчелосемей, включающие применение специальных лекарственных препаратов, кормовых добавок и кормов, стимулирующих яйцекладку, способствующих укреплению иммунитета пчел, снижению токсикоза, улучшению качества расплода, содержащих витамины, в том числе янтарную и аскорбиновую кислоту, а также незаменимые аминокислоты.

Особые указания

Побочных явлений и осложнений у пчел при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При передозировке лекарственным препаратом может наблюдаться беспокойство и выкучивание пчел из ульев.

Не рекомендуется обрабатывать семьи пчел силой менее 5 улочек.

Сведения о несовместимости лекарственного препарата с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют.

Не рекомендуется применять Тропигель одновременно с другими акарицидными лекарственными препаратами.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не установлено.

Следует избегать нарушений доз и курса применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно быстрее в той же дозе по той же схеме.

Мед, полученный от семей пчел, обработанных препаратом Тропигель в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

Упаковка

Лекарственный препарат Тропигель выпускают расфасованным по 25 г в герметично запаянные пакеты из металлизированной или полимерной пленки или в пакеты из кислотопроницаемого нетканого материала, упакованные по 4, 8, 12, 16 и 20 штук в полимерные банки (контейнеры) или в картонные пачки.

Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при температуре от 0°C до 30°C.

Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

После вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению не подлежит.