

Вирусан 40 г

Инструкция по применению

Состав и форма выпуска

Лекарственная форма: порошок для орального применения.

Вирусан в 1 г содержит в качестве действующих веществ: римантадин (в форме гидрохлорида) – 0,5%, аскорбиновая кислота – 12,5% и вспомогательные вещества.

По внешнему виду препарат представляет собой однородный мелкодисперсный порошок светло-коричневого цвета с запахом чеснока.

Фармакологическое действие

Вирусан относится к группе противовирусных лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Входящий в состав Вирусана римантадина гидрохлорид угнетает выход из клеток вирусных частиц, способствуют их гибели, оказывая противовирусное действие, а аскорбиновая кислота стимулирует рост, развитие и продуктивность пчел, повышает их резистентность к неблагоприятным факторам внешней среды.

По степени воздействия на организм Вирусан относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием.

Вирусан не токсичен для пчел, в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность семей медоносных пчел, не ухудшает качество товарной продукции пчеловодства.

Дозы и способ применения

Вирусан предназначен для профилактики и лечения вирусных болезней пчел (острый и хронический паралич, вирус деформации крыла, вирус мешотчатого расплода), а также для стимуляции роста, развития и повышения устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды.

Запрещается применение Вирусана менее чем за 30 суток до начала главного медосбора и осенью до откачки товарного меда во избежание попадания препарата в товарный мед.

При проведении лечебных мероприятий с использованием препарата Вирусан следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы с препаратом не разрешается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с

гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Вирусаном.

В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Вирусан применяют пчелам в смеси с сахарным сиропом весной (апрель-май) перед главным медосбором и в конце лета (август-сентябрь) после откачки меда.

Препарат растворяют в теплом (35°C – 40°C) сахарном сиропе, приготовленном в соотношении 1 : 1, из расчета 20 г Вирусана на 5 л сахарного сиропа (или 40 г Вирусана на 10 л сахарного сиропа).

Приготовленный сироп разливают в верхние ульевые кормушки из расчета 1 л сиропа на одну семью и применяют 2 – 3 раза с интервалом 2 – 3 дня.

Особые указания

Особенностей действия при первом применении лекарственного препарата и его отмене не установлено.

Вирусан не предназначен для применения теплокровным животным.
Симптомы передозировки препарата у пчел не выявлены.

Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной обработки применение препарата следует возобновить в той же дозе по той же схеме.

При применении Вирусана в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у пчел, как правило, не наблюдается.

Информация о несовместимости Вирусана с препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками, применяемыми в пчеловодстве, отсутствует.

Мед, полученный от семей пчел, после применения Вирусана в соответствии с настоящей инструкцией, может быть использован на общих основаниях.

Упаковка

Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 20 г и 40 г в герметично запаянных пакетах из металлизированной пленки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Условия хранения

Лекарственный препарат Вирусан хранят в закрытой упаковке производителя в защищённом от влаги и прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0° С до 25° С.

Вирусан следует хранить в недоступном для детей месте.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Лекарственный препарат Вирусан отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата Вирусан по истечении срока годности.